

# Alphonse Lavallée

**Synonyme Bezeichnungen:** Ribier, Royal Albert, Enfes

**Herkunft:** Frankreich

**Abstammung:** Kreuzung aus Bellino x Lady Down's Seedling

**Verbreitung in Österreich:** geringfügig

## Ampelographische Merkmale:

### Merkmale während der Blütezeit

Junger Trieb: Triebspitze offen, schwache Anthocyanfärbung, mittel bis stark wollig behaart, aufrechte Triebhaltung, diskontinuierliche Verteilung der langen Ranken

Internodien: dorsal grün mit roten Streifen, ventral grün

Knospenschuppen: fehlende Anthocyanfärbung



Junges Blatt - Oberseite: grüne Blattfläche mit bronzierten Stellen

Junges Blatt - Unterseite: starke Wollbehaarung zwischen den Nerven



### Beobachtungszeitraum vom Beerenansatz bis zum Weichwerden der Beeren

Ausgewachsenes Blatt: kreisförmig bis fünfeckig, drei Lappen, ebenes bis nach oben eingerolltes Profil, Hauptnerven auf der Blattoberseite vom Stielansatz bis zur ersten Abzweigung mit roter Anthocyanfärbung, Spreite sehr schwach gewaffelt und schwach blasig, Blattzähne einerseits hohl, andererseits rund gewölbt, Stielbucht offen bis geschlossen mit V-förmiger Basis, nicht von Nerven begrenzt, Zähne in der Stielbucht kaum und in den oberen Seitenbuchten nicht vorhanden, Blattunterseite mittlere bis starke Behaarung, fehlende bis schwache Beborstung der Hauptnerven



## Traube und Beere während der Reife

Traubenstiel: kurz bis mittel (5-7 cm)

Traube: sehr lang (ca. 24 cm), locker, Grundtraube kegelförmig mit drei bis vier Flügeln, Beitraube nicht vorhanden

Beere: rundlich (l = 23 mm, b = 23 mm), Einzelbeeregewicht sehr hoch (8 g), Haut violett-blau, weiches bis mäßig festes Fruchtfleisch, Geschmack neutral, Samen vollständig ausgebildet



## Phänologie:

Austrieb	spät
Blütezeit	mittel bis spät
Reifezeit	spät
Winterfrost-Resistenz	schwach
Frühjahrsfrost-Regeneration	schwach
Plasmopara-Toleranz	schwach
Oidium-Toleranz	schwach
Botrytis-Toleranz	mittel
Platzneigung	mittel

## Agrarische Eigenschaften:

kurzer Schnitt, leistungsstark, normalerweise für die Tafeltraubenproduktion verwendet

## Qualitätsprofil der Weine:

einfache Tafelweine mit wenig Potenzial

## Züchterische Bearbeitung:

in Österreich keine

