

# Fanny

**Synonyme Bezeichnungen:** keine

**Herkunft:** Ungarn

**Abstammung:** Kreuzung aus Villard blanc x (Téli muskatály x Olimpia)

**Verbreitung in Österreich:** geringfügig

## Ampelographische Merkmale:

### Merkmale während der Blütezeit

Junger Trieb: Triebspitze offen, schwache Anthocyanfärbung, mittelstark wollig behaart, halb aufrechte Triebhaltung, diskontinuierliche Verteilung der langen Ranken

Internodien: dorsal grün mit roten Streifen, ventral grün

Knospenschuppen: keine Anthocyanfärbung

Junges Blatt - Oberseite: grüne Blattfläche mit bronzierten Stellen

Junges Blatt - Unterseite: sehr schwache Wollbehaarung zwischen den Nerven



### Beobachtungszeitraum vom Beerenansatz bis zum Weichwerden der Beeren

Ausgewachsenes Blatt: fünfeckig bis kreisförmig, drei bis fünf Lappen, gewelltes Profil, Hauptnerven auf der Blattoberseite ohne Anthocyanfärbung, Spreite kaum gewaffelt und kaum blasig, Blattzähne beiderseits geradlinig, Stielbucht weit offen mit U-förmiger Basis, kaum von Nerven begrenzt, keine Zähne in der Stielbucht, aber in den oberen Seitenbuchten, Blattunterseite ohne Behaarung, keine Beborstung der Hauptnerven



## Traube und Beere während der Reife

Traubenstiel: kurz bis mittellang (5-7 cm)

Traube: lang (~20 cm), sehr locker, Grundtraube kegel- bis trichterförmig mit ein bis zwei Flügeln, Beitraube nicht vorhanden

Beere: rundlich bis oval (l = ~20 mm, b = ~18 mm), Einzelbeerengewicht gering bis mittel (3-5 g), Haut grün bis gelb, Fruchtfleisch weich bis mäßig fest, Samen vollständig ausgebildet

## Phänologie:

Austrieb	spät
Blütezeit	spät
Reifezeit	mittel
Winterfrost-Resistenz	mittel
Frühjahrsfrost-Regeneration	gering
Plasmopara-Toleranz	gut
Oidium-Toleranz	gut
Botrytis-Toleranz	gut
Platzneigung	mittel



## Agrarische Eigenschaften:

sehr ertragreich, benötigt gute Böden

## Qualitätsprofil der Weine:

Tafeltraube, geringe Eignung zur Weinbereitung

## Züchterische Bearbeitung:

in Österreich keine

