

Sangiovese

Synonyme Bezeichnungen: Brugnello di Montalcino, Sangiovetto Grosso, Nielluccio, Sangioveze, Toustain, Brunello und zahlreiche andere

Herkunft: Toskana, Italien

Abstammung: Cilieglio x Calabrese Montenuovo

Verbreitung in AUT: geringfügig

Ampelographische Merkmale:

MERKMALE WÄHREND DER BLÜTEZEIT

Junger Trieb: Triebspitze offen, keine Anthozyanfärbung, schwach bis mittel wollig behaart; aufrechte Triebhaltung;

Internodien: dorsal: grün, ventral: grün;

Knospenschuppen: fehlende Anthozyanfärbung auf der ganzen Knospe;

diskontinuierliche Verteilung der mittellangen bis langen Ranken;

Junges Blatt: Oberseite: grüne-gelbe Blattfläche,

Blattunterseite: schwache Wollbehaarung zwischen den Nerven ;



BEOBACHTUNGSZEITRAUM VOM BEEREN-ANSATZ BIS ZUM WEICHWERDEN DER BEEREN:

Ausgewachsenes Blatt: Keilförmig bis fünfeckig mit 3 bis 5 Lappen und ebenes bis gewelltes Profil;

Hauptnerven auf der Blattoberseite ohne

Anthozyanfärbung;

Die Spreite ist sehr schwach gewaffelt und schwach bis mittel blasig;

Blattzähne sind abwechseln geradlinig und rundgewölbt;

Stielbucht weit offen bis offen mit U-förmiger Basis;

kaum von Nerven begrenzt;

Zähne in der Stielbucht und in den oberen Seitenbuchten fehlen;

Blattunterseite ohne Behaarung, fehlende Beborstung der Hauptnerven.



TRAUBE UND BEERE WÄHREND DER REIFE:

Traube: ist lang (20 cm); mittel-dicht;
Grundform ist kegelförmig mit ein bis vier
Flügeln;
Beitraube nicht vorhanden;

Traubenstiel: mittel (7 cm);

Beere: Form ist rundlich-oval, Länge ist mittel
(18 mm), Breite ist schmal bis mittel (13-18 mm);
Einzelbeerengewicht ist gering (ca. 3 g);
Beerenhaut ist violett-blau;
weiches Fruchtfleisch; neutraler Geschmack;
Samen vollständig ausgebildet;



Phänologie:

Austrieb: früh;

Blütezeit: mittel;

Reifezeit: spät;

Resistenz gegenüber Winterfrost: mittel;

Regeneration nach Frühjahrsfrost: gering;

Resistenz gegenüber pilzlichen Schaderregern:

Plasmopara: gering;

Oidium: schwach;

Botrytis: gut;

Neigung der Beeren zum Platzen nach

Herbstniederschlägen: gering;

Agrarische Eigenschaften:

benötigt in Österreich Spitzenlage, leistungsstark, Ertragsreduktion nötig für eine gute Reife;

Qualitätsprofil der Weine:

trockener, gerbiger Wein mit intensiver rubinroter Färbung;

Züchterische Bearbeitung:

in Österreich keine, Klone in Italien verfügbar;