

# Chardonnay Stella RT

*Synonyme Bezeichnungen:*

*Herkunft: Rebschule Tschida GmbH, Apetlon*

*Abstammung: Chardonnay x Eger 2 (Selbstung von Villard blanc)*

*Verbreitung in AUT: Nur Versuchsflächen*

## Ampelographische Merkmale:

### MERKMALE WÄHREND DER BLÜTEZEIT

*Junger Trieb: Triebspitze halb offen;*

*fehlende Anthocyanverfärbung; mittlere - starke*

*Wollbehaarung;*

*Halbaufrechte Triebhaltung;*

*diskontinuierliche Verteilung der mittellangen Ranken;*

*Internodien: dorsal: grün mit roten Streifen; ventral:*

*grün;*

*Knospenschuppen: Basal mittlere Anthocyanverfärbung;*

*Junges Blatt: Oberseite: leicht Bronziert, schwache*

*Wollbehaarung zwischen den Nerven;*

*Blatt Unterseite: fehlend – sehr schwache Wollbehaarung zwischen den Nerven, schwache*

*Borstenbehaarung der Hauptnerven;*

*Blüte: zwittrig;*



### BEOBACHTUNGSZEITRAUM VOM BEEREN-ANSATZ BIS ZUM WEICHWERDEN DER BEEREN:

*Ausgewachsenes Blatt: Keilförmig, mit fünf Lappen und ein welliges Profil;*

*Die Hauptnerven auf der Blattoberseite haben eine mittlere Anthocyanverfärbung;*

*Die Spreite hat eine mittlere - starke Waffelung und eine starke Blasigkeit;*

*Die Zähne fehlen in der Stielbucht und in den Seitenbuchten;*

*Die Zahnformen sind eine Mischung aus beiderseits geradlinig und beiderseits konvex;*

*Die Stielbucht ist offen, klammerförmig und von Nerven einseitig begrenzt;*

*Blatt Unterseite: fehlende – sehr schwache*

*Wollbehaarung zwischen den Nerven; schwache*

*Borstenbehaarung der Hauptnerven*



## TRAUBE UND BEERE WÄHREND DER REIFE:

*Traube: kurze - mittlere Traubenlänge (120 – 150mm);  
Grundform ist kegelförmig mit bis zu zwei Flügeltrauben;  
eine dichte Traube, häufig mit einer Beitraube;*

*Traubenstiel: sehr kurzer Stiel (<30mm);*

*Beere: kugelförmig, rund, Länge ist kurz-mittel  
(15mm) und Breite ist schmal-mittel (15mm);  
Beerengewicht ist gering (2g)  
Beerenhaut ist gelbgrün, der Nabel ist gut  
sichtbar;  
Das Fruchtfleisch ist nicht gefärbt, kein  
besonderer Geschmack, Samen sind vorhanden,  
weiches Fruchtfleisch;*



## PHÄNOLOGIE:

*Austrieb: mittel;*

*Blütezeit: früh;*

*Reifezeit: früh;*

*Resistenz gegenüber Winterfrost: nicht bekannt*

*Regeneration nach Frühjahrsfrost: nicht bekannt*

*Resistenzen gegenüber pilzlichen Schaderregern:*

*Plasmopara: nicht bekannt*

*Oidium: nicht bekannt*

*Botrytis: stark*

*Neigung der Beeren zum Platzen nach*

*Herbstniederschlägen: nicht bekannt*

*Agrarische Eigenschaften:*

*nicht bekannt*

*Qualitätsprofil der Weine:*

*nicht bekannt*

*Züchterische Bearbeitung:*

*nicht bekannt*