

Cot

Synonyme Bezeichnungen: Auxerrois, Balouzat, Cahors, Cauly, Etranger, Mourame, Pressac, Cot Malbec, Cot Rouge, Malbec

Herkunft: Frankreich

Abstammung: traditionelle Rebsorte entstanden durch eine Kreuzung der unbekannteren Sorte Magdeleine noir des Charentes X Prunelard

Verbreitung in Österreich: geringfügig

Ampelographische Merkmale:

Merkmale während der Blütezeit

Junger Trieb: Triebspitze offen, schwache bis mittlere Anthocyanfärbung, stark wollig behaart, aufrechte Triebhaltung, diskontinuierliche Verteilung der mittellangen Ranken

Internodien: dorsal grün mit roten Streifen bis rot, ventral grün bis grün mit roten Streifen

Knospenschuppen: schwache bis mittlere Anthocyanfärbung bis zur Mitte


Junges Blatt - Oberseite: bronzierte bis ganzflächig kupferrote Blattfläche

Junges Blatt - Unterseite: schwache Wollbehaarung zwischen den Nerven



Beobachtungszeitraum vom Beerenansatz bis zum Weichwerden der Beeren

Ausgewachsenes Blatt: keilförmig bis fünfeckig, ungeteilt oder drei Lappen, ebenes Profil, Hauptnerven auf der Blattoberseite meist ohne Anthocyanfärbung, Spreite sehr schwach gewaffelt und stark blasig, Blatzzähne beider-



seits geradlinig, Stielbucht offen mit V-förmiger Basis, nicht von Nerven begrenzt, keine Zähne in der Stielbucht und den oberen Seitenbuchten, Blattunterseite mittelstark behaart, keine Beborstung der Hauptnerven

Traube und Beere während der Reife

Traubenstiel: kurz bis mittel (5-7 cm)

Traube: mittellang (16 cm), mitteldicht, Grundtraube kegelförmig mit ein bis zwei Flügeln, Beitraube nicht vorhanden

Beere: rundlich (l = 13 mm, b = 13 mm), Einzelbeeregewicht gering (ca. 3 g), Haut blau bis schwarz, Fruchtfleisch weich, Geschmack neutral, Samen vollständig ausgebildet



Phänologie:

Austrieb	früh
Blütezeit	mittel
Reifezeit	mittel
Winterfrost-Resistenz	schwach
Frühjahrsfrost-Regeneration	schwach
Plasmopara-Toleranz	mittel bis schwach
Oidium-Toleranz	mittel
Botrytis-Toleranz	mittel bis schwach
Platzneigung	gering

Agrarische Eigenschaften:

schwachwüchsige Unterlagen oder dichtere Pflanzungen empfohlen, verrieselt leicht

Qualitätsprofil der Weine:

tiefrote, früh trinkbare Weine, fruchtig

Züchterische Bearbeitung:

in Österreich keine

