

Königin der Weingärten

Synonyme Bezeichnungen: Muskat Queen of the Vinyards (USA), Regina die Vigneti (I), Reine des Vignes (F), Szőlőkertek királynője (H); Kraljica vinograda (SLO)

Herkunft: H, 1916, Kecskemét-Katonatelep, János Mathiász Züchter

Abstammung: Erzsebet Kiralyne emleke x Perle von Csaba

Verbreitung: weltweit

Verbreitung in AUT: in allen Weinbaugebieten

Ampelographische Merkmale:

MERKMALE WÄHREND DER BLÜTEZEIT

Junger Trieb: Triebspitze offen, keine Anthozyanfärbung, schwach wollig behaart;

halb aufrechte Triebhaltung;

Internodien: dorsal: grün, ventral: grün bis grün mit roten Streifen;

Knospenschuppen: schwache Anthozyanfärbung bis zur Mitte;

diskontinuierliche Verteilung der mittel langen Ranken;

Junges Blatt: Oberseite: grün auf der ganzen Blattfläche,

Blattunterseite: keine Wollbehaarung zwischen den Nerven;

Blüte: zwittrig



BEOBACHTUNGSZEITRAUM VOM BEEREN-ANSATZ BIS ZUM WEICHWERDEN DER BEEREN:

Ausgewachsenes Blatt: Keilförmig, mit 5 Lappen und V Profil;

Hauptnerven auf der Blattoberseite grün;

Die Spreite ist nicht gewaffelt und sehr schwach blasig;

Blattzähne beiderseits geradlinig;

Stielbucht offen mit klammerförmiger Basis;

von Nerven nicht begrenzt;

keine Stielbuchtzähne;

Auch keine Zähne in den oberen Seitenbuchten vorkommend;

Blattunterseite nicht behaart,

Beborstung der Hauptnerven fehlt.



TRAUBE UND BEERE WÄHREND DER REIFE:

Traube: ist lang (20-25 cm); locker;
Grundform ist kegelförmig mit ein bis drei Flügeln;
Beitraube fehlt;

Traubenstiel: ist sehr lang (>11 cm);

Beere: Form ist oval; Länge ist mittellang bis sehr lang (20-26 mm),
Breite ist schmal bis mittellang (14-20 mm);
Einzelbeeregewicht ist mittel (~4 g);
Beerenhaut ist grün-gelb;
ungefärbtes Fruchtfleisch; Muskatgeschmack;
Samen vollständig ausgebildet;



Phänologie:

Austrieb: mittel bis spät;

Blütezeit: mittel bis spät;

Reifezeit: mittel;

Resistenz gegenüber Winterfrost: schwach;

Regeneration nach Frühjahrsfrost: nicht bekannt;

Resistenz gegenüber pilzlichen Schaderregern:

Plasmopara: schwach;

Oidium: schwach;

Botrytis: mittel;

Neigung der Beeren zum Platzen nach

Herbstniederschlägen: mittel;

Agrarische Eigenschaften:

benötigt gute Lagen und gute Böden, unregelmäßiger Ertrag;

Qualitätsprofil der Weine:

einfacher muskierter Tafelwein;

Züchterische Bearbeitung:

keine Bearbeitung in Österreich;