

Kerner

Synonyme Bezeichnungen: Herold Weiß

Herkunft: gezüchtet in Deutschland

Abstammung: Kreuzung aus Trollinger x Riesling

Verbreitung in Österreich: größere Flächen im alpinen Raum (Kärnten), sonst geringfügig

Ampelographische Merkmale:

Merkmale während der Blütezeit

Junger Trieb: Triebspitze offen, schwache Anthocyanfärbung, mittelstark wollig behaart, aufrechte Triebhaltung, diskontinuierliche Verteilung der kürzeren bis mittellangen Ranken

Internodien: dorsal grün mit roten Streifen bis rot, ventral grün


Knospenschuppen: keine bis schwache Anthocyanfärbung bis zur Mitte

Junges Blatt - Oberseite: grüne Blattfläche mit bronzierten Stellen

Junges Blatt - Unterseite: schwache Wollbehaarung zwischen den Nerven

Beobachtungszeitraum vom Beerenansatz bis zum Weichwerden der Beeren

Ausgewachsenes Blatt: kreisförmig mit fünf Lappen und gewelltem Profil, Hauptnerven auf der Blattoberseite bis zum Stielansatz mit mittelstarker Anthocyanfärbung, Spreite mittelstark gewaffelt und schwach blasig, Blattzähne beiderseits rund gewölbt, Stielbucht überlappend mit V-förmiger Basis, nicht von Nerven begrenzt, Zähne in der Stielbucht und in den oberen Seitenbuchten fehlen, Blattunterseite mit mittelstarker Behaarung, mittelstarke Beborstung der Hauptnerven



Traube und Beere während der Reife

Traubenstiel: kurz (5 cm)

Traube: kurz (8-12 cm), dicht, Grundtraube kegelförmig, ohne oder mit ein bis zwei Flügeln, Beirtraube nicht vorhanden

Beere: rundlich (l = 13 mm, b = 13 mm), Einzelbeerengewicht sehr gering bis gering (1-3 g), Haut grün bis gelb, Fruchtfleisch weich, Geschmack neutral, Samen vollständig ausgebildet

Phänologie:

Austrieb	mittel
Blütezeit	mittel
Reifezeit	mittel bis spät
Winterfrost-Resistenz	gut
Frühjahrsfrost-Regeneration	gering
Plasmopara-Toleranz	mittel
Oidium-Toleranz	schwach
Botrytis-Toleranz	mittel
Platzneigung	mittel



Agrarische Eigenschaften:

leistungsstarke Sorte, erfordert Ausdünnung, unproblematisch im Weingarten, starkwüchsig

Qualitätsprofil der Weine:

kräftig runder Wein, der vom Extrakt profitiert

Züchterische Bearbeitung:

Material nur aus Deutschland verfügbar

